

Rally™ 40

Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Myclobutanil.....400 g/kg
Excipientesc.s.p. 1kg

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Registro Nacional N°: 85-F1/NA

**Titular de Registro: CONSULTLMZ Cia. Ltda, Representante en Ecuador de
DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.**

Av. 23 Rodrigo de Chávez S/N Conjunto Ciudad Colón, Edificio Empresarial II Oficina 308.
Frente al Parque El Salado Guayaquil - Ecuador. Telf.: (04) 390-1953

FORMULADO POR:
Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road,
Indianápolis, IN 42268
United States of America.
Tlf: + 1 317 337 3000

DISTRIBUIDO POR:
FarmAgro S.A.
Km. 9,5 Vía Daule Los Vergeles 1-6-7, junto a
Sal del Pacífico, manzana 263,
Parque Industrial Los Vergeles
Guayaquil, Tel. 04.2590600

 Dow AgroSciences

Farm  **Agro**

El compadre del agro

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow



DAÑINO

Rally™ 40

Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE (WP)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Rally™ 40 es un fungicida sistémico con propiedades protectoras y curativas. Se absorbe rápidamente y mata al hongo hasta 4 días después de haberse iniciado la infección.

Utilizar **Rally™ 40** con equipos que permitan una buena cobertura de las plantas con gotas de tamaño fino y preferentemente usando boquillas de cono. Para mejorar la cobertura y distribución del producto se recomienda el uso de **Kaytar™ ACT** al 25%. Alternar las aplicaciones con **Rally™ 40** con fungicidas de diferente modo de acción.

Preparación de la mezcla

Adicional la dosis total de **Rally™ 40 PM** al tanque de aspersión conteniendo la mitad de agua a usar, mientras se agita continuamente; completar luego, el resto de agua. En caso de mezclas con otros productos, realizar pruebas previas de compatibilidad.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

INSTRUCCIONES DE USO

| CULTIVO | PLAGAS | DOSIS | PC |
|---|---|--------------------------|---------|
| CEBOLLA (<i>Allium cepa</i>) | MANCHA PÚRPURA (<i>Alternaria porri</i>) | 40 g/ha | 14 días |
| SOYA (<i>Glycine max</i>) | ROYA ASIÁTICA (<i>Phakospora pachyrhizi</i>) | 80 g/ha | 24 días |
| ARROZ (<i>Oriza sativa</i>) | MANCHADO DE GRANO (<i>Sarocladium oryzae</i>) | 80 g/ha | 25 días |
| MELÓN (<i>Cucumis melo</i>), SAMBO (<i>Cucurbita ficifolia</i>), SANDÍA (<i>Citrullus lanatus</i>), ZUCCHINI (<i>Cucurbita pepo</i>), ZAPALLO (<i>Cucurbita maxima</i>), PEPINILLO (<i>Cucumis sativus</i>) | CENIZA (<i>Erysiphe cichoracearum</i>) | 25-30 g/100 l de agua | 3 días |
| FRÉJOL (<i>Phaseolus vulgaris</i>), ARVEJA (<i>Pisum sativum</i>), CAUPÍ (<i>Vigna unguiculata</i>), CHOCHO (<i>Lupinus mutabilis</i>), GARBANZO (<i>Cicer arietinum</i>), HABA (<i>Vicia faba</i>), LENTEJA (<i>Lens culinaris</i>) | ANTRACNOSIS (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>) | 40 g/200 l de agua | 30 días |
| MANZANA (<i>Malus domestica</i>), PERA (<i>Pyrus communis</i>) | ROÑA (<i>Venturia inaequalis</i>) CENICILLA (<i>Podosphaera leucotricha</i>) | 12-15 g/100 l de agua | 14 días |



Rally™ 40

Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE (WP)

| CULTIVO | PLAGAS | DOSIS | PC |
|--|---|--------------------------|--------|
| CAPULÍ (<i>Prunus serotina</i>), CEREZA (<i>Prunus cerasus</i>), CIRUELA (<i>Prunus domestica</i>), REINA CLAUDIA (<i>Prunus salicina</i>), DURAZNO (<i>Prunus persica</i>) | ROÑA (<i>Venturia inaequalis</i>) CENICILLA (<i>Podosphaera leucotricha</i>) | 12-15 g/100 l de agua | 1 día |
| FRAMBUESA ROJA (<i>Rubus idaeus</i>), FRAMBUESA NEGRA (<i>Rubus occidentalis</i>), MORA (<i>Rubus glaucus</i>) | ROÑA (<i>Venturia inaequalis</i>) CENICILLA (<i>Podosphaera leucotricha</i>) | 12-15 g/100 l de agua | 6 días |
| FRESA (<i>Fragaria ananassa</i>) | ROÑA (<i>Venturia inaequalis</i>) CENICILLA (<i>Podosphaera leucotricha</i>) | 12-15 g/100 l de agua | 1 día |
| BANANO (<i>Musa acuminata</i> AAA) | PUDRICIÓN DE LA CORONA <i>(Fusarium sp., Verticillium sp.)</i> | 0,125 g/l | NA |

VOLUMEN DE AGUA:

Cebolla: 200l de agua por hectárea.

Soya: 200l de agua por hectárea.

Arroz: 200l de agua por hectárea.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Cebolla: Iniciar aplicación con los primeros síntomas de la enfermedad.

Soya: Usar el producto a la dosis indicada a partir de los 20 días de sembrado. Usar el producto dentro de programas de rotación con otras moléculas de diferente mecanismo de acción.

Arroz: Iniciar aplicación con los primeros síntomas de la enfermedad.

Melón, Sambo, Sandía, Zucchini, Zapallo, Pepinillo: Se recomienda no realizar más de 2 aplicaciones / campaña / año. El intervalo de aplicación es de 14 días o más. Volumen de agua: 100L. **Periodo de carencia: 3 días.**

Fréjol, Arveja, Caupí, Chocho, Garbanzo, Haba, Lenteja: Aplicar de manera preventiva o al apareamiento de los primeros síntomas de la enfermedad con un intervalo de aplicación de 7 a 10 días. Número de aplicaciones por ciclo de cultivo: 4. Volumen de agua: 200L. **Periodo de carencia: 30 días.**

Manzana, Pera, Capulí, Cereza, Ciruela, Reina Claudia, Durazno, Frambuesa roja y negra, Fresa y Mora: Para aplicaciones curativas inicie cuando el promedio del área foliar dañada sea menor a un 5,0%. Aplicar con un intervalo de aplicación de 7 a 10 días. Número de aplicaciones por ciclo de cultivo: 8. Volumen de agua: 100L. **Periodo de carencia: Manzana, Pera: 14 días.**

Cereza, Ciruela, Durazno, Capulí, Reina Claudia: 1 día. **Frambuesa roja y negra, Mora:** 6 días. **Fresa:** 3 días.

Banano: La aplicación se realiza en sala post cosecha del cultivo de banano (*Musa acuminata* AAA).



Rally™ 40

Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE (WP)

PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda esperar 24 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado.

FITOTOXICIDAD:

No presenta efectos fitotóxicos si se siguen las instrucciones dadas en la etiqueta.


COMPATIBILIDAD:

Si no se conoce la compatibilidad de mezclas, hacer pruebas previas.

RESPONSABILIDAD:

“El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO



Rally™ 40

Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE (WP)

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Tóxico si se ingiere. Causa irritación moderada a la piel y a los ojos. Evite el contacto con la piel y la ropa. Evitar respirar vapor o aspersión. Cuidado, evite el contacto, posible Teratogénico.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicamentos de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). “Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si hay lentes de contacto, quitarlas después de los primeros 5 minutos y continuar lavando los ojos.

En caso de ingestión, no induzca al vómito.

En caso de inconsciencia CONSULTAR CON UN MÉDICO.

Sintomatología: El contacto directo con el material puede producir irritación substancial a la piel, el contacto prolongado o repetido puede causar irritación a la piel.

Tratamiento: El tratamiento es sintomático y de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta”.



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800 VENENO (836366)

Atención las 24 horas del día.

ConsultLMZ Cia Ltda. Telf.: (04) 390-1953.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe re-utilizarse. Después de usar el contenido, inutilícela cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto ni con los desechos y envases vacíos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

Para la aplicación de **RALLY™ 40** se debe establecer una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados al consumo humano.”

