

# Kyventiq™

## Etiqueta Web - Ecuador

**FUNGICIDA AGRÍCOLA    SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Concentración:**

**Fenpicoxamid** ..... **130 g/l**

**Aditivos** ..... **c.s.p. 1l**

**Registro Nacional N°: 236-F1 / NA**

**Titular del Registro: CONSULTLMZ Cia Ltda, Representante en Ecuador de  
DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.**

Av.23 Rodrigo de Chávez S/N Conjunto Ciudad Colón, Edificio Empresarial II Oficina 308.  
Frente al Parque El Salado. Guayaquil- Ecuador. Telf.: (04) 390-1953.

**FORMULADO POR:**

 **Dow AgroSciences**

**DAS King's Lynn Dow AgroSciences Limited**  
Estuary Road. England. United Kingdom.

**Dow AgroSciences de Colombia S.A.**  
Km 14 Vía Mamonal Cartagena, Bolivar - Colombia

**DuPont de Nemours (France) S.A.S**  
Protection des Cultures. Usine de Cernay. 82,  
rue de Wittelsheim – B.P.9. 68701 Cernay Cedex. Francia

**DISTRIBUIDO POR:**

 **fertisa**

**Fertisa S.A.**  
Av. Don Bosco 5 y la N, Guasmo  
Fertisa (Vía Puerto Marítimo)  
PBX: (593 4) 3846 640

**CONSULTLMZ Cia Ltda.**  
Av. 23 Rodrigo de Chávez S/N Conjunto Ciudad Colón  
Edificio Empresarial II Oficina 308  
Guayaquil-Ecuador. Telf.: (04) 390-1953

® TM **Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow**

**CUIDADO**

# Kyventiq™

## Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

#### MECANISMO DE ACCIÓN

Fenpicoxamid es el primer miembro de una nueva clase de fungicidas: las picolinamidas. Es un inhibidor interno de la Quinona (Quil). **Kyventiq™** inhibe la respiración mitocondrial en el hongo. Fenpicoxamid actúa en un sitio diferente al sitio en que actúan las SDHI's y las estrobirulinas (Qol).

#### MODO DE ACCIÓN

Fenpicoxamid es un fungicida con actividad translaminar (movilidad local en las plantas), lo cual le confiere propiedades preventivas sobre *Mycosphaerella fijiensis* (Sigatoka Negra del Banano).\*

#### MODO DE EMPLEO

Se puede usar por aspersión vía aérea.

Se recomienda la adición de un aceite mineral y un emulsificante para mejorar la eficacia del producto. Para la preparación de la mezcla seleccione un buen aceite mineral y emulsificante. Realice pruebas de emulsión previas a la preparación de la mezcla, para determinar los pasos de adición adecuados y los correctos tiempos de agitación, acorde con el equipo usado.

### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga	Dosis	P.C.
Banano ( <i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra ( <i>Mycosphaerella fijiensis</i> )	385 ml/ha	0 días

P.C: Período de carencia

#### VOLUMEN DE MEZCLA:

19 litros de agua por hectárea.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

**Kyventiq™** debe ser utilizado como fungicida preventivo en los estadios de desarrollo de la enfermedad. Debe aplicarse máximo 3 ocasiones por año, solamente en rotaciones (no en bloques), dentro de un programa para el manejo de la Sigatoka negra (*Mycosphaerella fijiensis*). **Kyventiq™** debe ser aplicado solamente en mezclas (preferiblemente con fungicidas multi-sitio). Mezclar **Kyventiq™** con un fungicida uni-sitio SOLAMENTE si éste tiene buena eficacia; es decir que NO se haya encontrado pérdidas de sensibilidad o resistencia contra Sigatoka Negra en la región donde se aplicará.



# Kyventiq™

## Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA    SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**PERÍODO DE REINGRESO:**

Se recomienda esperar 12 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado.

**FITOTOXICIDAD:**

En las diferentes evaluaciones realizadas con **Kyventiq™** no se presentó fitotoxicidad al cultivo de banano.

**COMPATIBILIDAD:**

**Kyventiq™** no presenta incompatibilidad conocida. Se recomienda hacer pruebas preliminares.

**RESPONSABILIDAD:**

“El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO



# Kyventiq™

## Etiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

#### DE USO Y APLICACIÓN:

Causa irritación moderada a los ojos. Evite respirar vapor o aspersión. Evite el contacto con la piel y la ropa.

#### MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada antes de alcanzar el periodo de re-entrada.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

**“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS  
A LA SALUD Y AL AMBIENTE”**

#### ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicamentos de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). “Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

#### MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

**En caso de inhalación**, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

**En caso de contacto con la piel**, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

**En caso de contacto con los ojos** lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si hay lentes de contacto, quitarlas después de los primeros 5 minutos y continuar lavando los ojos.

**En caso de ingestión**, no induzca al vómito.

**En caso de inconsciencia** CONSULTAR CON UN MÉDICO.

**Sintomatología:** Puede ocasionar irritación moderada a los ojos con lesión ligera en las córneas. Puede causar irritación en el tracto respiratorio superior (nariz y garganta). No se esperan síntomas y efectos adicionales, las reacciones en cada paciente pueden variar.

**Tratamiento:** El tratamiento es sintomático y de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente.

**Antídoto:** No se conoce antídoto específico.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta”.



#### EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

**1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.  
ConsultLMZ Cia Ltda. Telf: (04) 390-1953**

#### MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe re-utilizarse. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

#### MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua. Tóxico para organismos acuáticos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, ni con los desechos y envases vacíos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

Para la aplicación de **Kyventiq™** se debe establecer una franja de seguridad de 60 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados al consumo humano.

