

Intrepid[™]

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Concentración:

Methoxyfenozide 240 g/l

Aditivos c.s.p. 1l

Registro Nacional N°: 105-I1/NA

Titular del Registro:

CORTEVA AGRISCIENCE DE ECUADOR S.A.

Av. 6 de diciembre 2816 y Paúl Rivet. Edificio Josueth Gonzáles. Oficina 10. Quito, Ecuador.

FORMULADO POR:



Corteve Agriscience de Colombia S.A.S.

Km 14 Via Mamonal
Cartagena, Bolívar - Colombia
Conmutador: (605) 693 2800

DISTRIBUIDO POR:



UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

Interoc

Km 16.5 Vía Daule.
Teléfono 59342881662
Guayaquil - Ecuador.

[™] ® Marcas registradas de Corteve Agriscience y de sus compañías afiliadas.

© Corteve.

CUIDADO

Intrepid™

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Antes de usar **Intrepid™** agitarlo adecuadamente mientras está cerrado. **Intrepid™** es un insecticida que irrita la hormona natural de la muda de los insectos, ecdisona, en el control de larvas de LEPIDOPTEROS. Hacer las aplicaciones sobre las larvas. La adición de un humectante asegura un mejor cubrimiento y adherencia del producto en las hojas. **Intrepid™** controla larvas de Lepidopteros que atacan diferentes cultivos. Las larvas tratadas dejan de comer a las 24 horas, no pueden deshacerse de su vieja muda y mueren por deshidratación e inanición a partir de las 72 horas. Debido a su alta selectividad para insectos benéficos, es recomendado en el Manejo Integrado de Plagas (MIP).

MODO DE EMPLEO:

Para preparar la mezcla, verter agua en el tanque de pulverización hasta la mitad de su capacidad, agregar luego la dosis de **Intrepid™**. Añadir el resto de agua hasta completar el volumen y aplicar.

Equipos y volumen de mezcla: Realizar la aplicación con bomba de mochila manual o aguilón, dirigida al follaje de la maleza a controlar y cubriendo de manera homogénea las plantas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS	P.C.
MANGO (<i>Mangifera indica</i>)	Gusano medidor (<i>Pleuroprucha asthenari</i>)	300 ml / ha	3 días
BRÓCOLI (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Botrytis</i> subvar. <i>Cymosa</i>)	Plutella (<i>Plutella xylostella</i>)	0,4 l / ha	3 días
SOYA (<i>Glycine max</i>)	Gusano sandwichero (<i>Hedylepta indicata</i>)	200 ml / ha	15 días
MELÓN (<i>Cucumis melo</i>) SAMBO (<i>Cucurbita ficifolia</i>) SANDÍA (<i>Citrullus lanatus</i>) ZUCCHINI (<i>Cucurbita pepo</i>) ZAPALLO (<i>Cucurbita maxima</i>) PEPINILLO (<i>Cucumis sativus</i>)	Gusano perforador de fruta (<i>Diaphania</i> spp.)	150 - 250 ml / ha	3 días
CÍTRICOS (<i>Citrus</i> spp.)	Minador de los cítricos (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	25-30 ml / 100 l de agua	1 día

P.C: Período de carencia.



Intrepid[™]

VOLUMEN DE AGUA:

Soya: 200 l de agua/ha. **Brócoli:** 400 l de agua/ha. **Mango:** 600 l de agua/ha. **Cítricos:** 400-600 l/ha. **Melón, Sambo, Sandía, Zucchini, Zapallo, Pepinillo:** 400 l/ha.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

MANGO: Realizar una aplicación al inicio de la floración con presencia de la plaga.

BRÓCOLI: Aplicar en presencia de los primeros estadios de la plaga; máximo 2 aplicaciones por ciclo.

SOYA: Realizar 1 aplicación con intervalos de 7 a 10 días.

Para el caso de **MELÓN, SAMBO, SANDÍA, ZUCCHINI, ZAPALLO, PEPINILLO:** Realizar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo (la primera durante el período de floración y la segunda durante el período de desarrollo del fruto).

En **CÍTRICOS**, realizar aplicaciones a partir de los primeros ataques de la plaga, con un intervalo de aplicación de 10 a 14 días.

PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda esperar 24 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado.

FITOTOXICIDAD:

No presenta efectos fitotóxicos si se siguen las instrucciones dadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD:

No es probable que suceda incompatibilidad química en las mezclas de tanque recomendadas comercialmente con otros plaguicidas y/o fertilizantes.

RESPONSABILIDAD:

“El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO



Intrepid™

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Peligroso si es inhalado. Evitar respirar (polvo, vapor o aspersión). Evite el contacto con la piel y la ropa.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

**“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS
A LA SALUD Y AL AMBIENTE”**

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicamentos de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). “Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación, traslade a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. Si la persona no respira llame a un centro de emergencia.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón, llame a un centro de emergencia.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si hay lentes de contacto, quitarlas después de los primeros 5 minutos y continuar lavando los ojos.

En caso de ingestión, no induzca al vómito.

En caso de inconsciencia: CONSULTAR CON UN MÉDICO.

Sintomatología: Las reacciones en cada paciente pueden variar. La exposición excesiva puede provocar metahemoglobinemia y como consecuencia la disminución de la capacidad de la sangre para transportar oxígeno.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Tratamiento: El tratamiento de la exposición se dirigirá al control de los síntomas y a las condiciones clínicas del paciente.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta”.



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) Atención las 24
horas del día. CISPROQUIM 1800593005
CORTEVA AGRISCIENCE ECUADOR S.A.
02223 2720. Ext 114.**

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe re-utilizarse. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto ni con los desechos y envases vacíos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

Para la aplicación de **INTREPID™** se debe establecer una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados al consumo humano.

En caso de derrame, recoja con material absorbente y deseche de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades.

